

Errata

Leider sind zwei Abschnitte von Kapitel 3.8 fehlerhaft gedruckt. Bitte vermerken Sie die korrekte Schreibweise:

Kapitel 3.8 Benigne, hormoninaktive Nebennierentumoren

S. 94, 2. Spalte, Zeile 9 ff:

„Wegen der Strahlenbelastung sollte die Nebennierenszintigraphie bevorzugt bei größeren (> 3 cm) endokrin inaktiven Tumoren durchgeführt werden, bei denen die Computertomographie Hounsfield-Einheiten aufweist, die über denen liegen, die für Nebennierenadenome zu erwarten sind.“

S. 95, 1. Spalte, Zeile 17 ff:

„Sie sollte nur bei Patienten eingesetzt werden, bei denen eine Nebennierenraumforderung als einziger Hinweis auf Metastasen eines bekannten Primärtumors gelten kann.“

Falls Sie weitere Fehler finden, senden Sie uns bitte Hinweise darauf an die unten angegebene Adresse. So können wir diese im Falle einer Neuauflage korrigieren. Für Ihre Mühe herzlichen Dank.

Frau Dr. D. Guth
Fachbuch Medizin
Springer-Verlag GmbH & Co. KG
Tiergartenstraße 17
69121 Heidelberg
<mailto:guth@springer.de>

Klinische Endokrinologie und Stoffwechsel

Nawroth, P.P.; Ziegler, R. (Hrsg.)

2001, XXIV, 874 S. 505 Abb., 338 Abb. in Farbe. In 2

Bänden, nicht einzeln erhältlich., Hardcover

ISBN: 978-3-540-64765-2