


# Durch Rauchen bedingte Todesfälle – Lungenkrebs


## Durch Rauchen bedingte Lungenkrebstodesfälle bei Frauen

Stand: 2007

Von 100 im Jahr 2007 an Lungenkrebs gestorbenen Frauen sind...



...Todesfälle durch das Rauchen bedingt.



Datenbasis: Todesursachenstatistik 2007, Mikrozensus 2005

Lungenkrebs ist eine der tückischsten Krebserkrankungen, da die Überlebenschancen gering sind.

Die 5-Jahres-Überlebensraten betragen für Lungenkrebspatienten 15 % bei Männern und 18 % bei Frauen. Insgesamt sterben in Deutschland jährlich fast 42.000 Menschen im Alter von über 30 Jahren an Lungenkrebs.

Damit ist diese Erkrankung in Deutschland die viert-häufigste Todesursache.

Für Lungenkrebs stellt

Rauchen den bedeutendsten Risikofaktor dar.

Etwa 60 % der Lungenkrebstodesfälle bei

Frauen und etwa 90 % der


Lungenkrebstodesfälle bei Männern sind durch das Rauchen bedingt. Auf beide Geschlechter bezogen sind das 80 % aller Lungenkrebstodesfälle.

*Lungenkrebs ist für ein Drittel der durch Rauchen bedingten Todesfälle verantwortlich.*


## Durch Rauchen bedingte Lungenkrebstodesfälle bei Männern

Stand: 2007

Von 100 im Jahr 2007 an Lungenkrebs  
gestorbenen Männern sind...



...Todesfälle durch das Rauchen bedingt.



Datenbasis: Todesursachenstatistik 2007,  
Mikrozensus 2005

**13 von 16 Lungenkrebstodesfällen im Alter über 35 sind tabakbedingt:  
33.213 von 41.460 Todesfällen (80,1%).**



## 2.11

# Durch Rauchen bedingte Todesfälle – Herzerkrankungen

Die ischämischen Herzerkrankungen (Herzinfarkt und Koronare Herzkrankheit) sind die häufigsten Todesursachen in Deutschland. Insgesamt sind im Jahr 2007 etwa 140.000 Menschen an diesen Krankheiten gestorben.


Ein bedeutender Risikofaktor für Herzerkrankungen ist das Rauchen: Etwa 13 % der Todesfälle durch ischämische Herzerkrankungen sind durch Rauchen bedingt, 19 % bei Männern und 7 % bei Frauen.

*Herzerkrankungen sind die häufigsten Todesursachen in Deutschland.*


### Durch Rauchen bedingte Todesfälle durch ischämische Herzerkrankungen bei Frauen

Stand: 2007

Von 100 im Jahr 2007 an ischämischen Herzerkrankungen gestorbenen Frauen sind...




...Todesfälle durch das Rauchen bedingt.



## Die häufigsten Todesursachen

Stand: 2007




Daten: Todesursachenstatistik 2007




## Durch Rauchen bedingte Todesfälle durch ischämische Herzerkrankungen bei Männern

Stand: 2007

Von 100 im Jahr 2007 an ischämischen Herzerkrankungen gestorbenen Männern sind...



...Todesfälle durch das Rauchen bedingt.



Datenbasis: Todesursachenstatistik 2007, Mikrozensus 2005

**Zwei von 16 Todesfällen an ischämischen Herzerkrankungen im Alter über 35 sind tabakbedingt: 17.882 von 139.638 Todesfällen (12,8%).**



Tabakatlas Deutschland 2009

(Hrsg.)

2009, IX, 114 S., Softcover

ISBN: 978-3-7985-1882-7