

Kapitel 7

Differentialrechnung für Funktionen einer Veränderlichen

7.1 Ableitung

Definition. (Differenzierbarkeit, Ableitung, Differentialquotient)

7/1/3

f ist an der Stelle a (oder kurz in a) differenzierbar

$\stackrel{\text{Def}}{=} f$ ist in einer Umgebung $U(a)$ definiert, und es existiert $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$.

Der Limes heißt (falls er existiert) *erste Ableitung* oder *Differentialquotient* von f in a .

$$\text{Bez. } f'(a) = \frac{df}{dx}(a).$$

Bemerkung. Bei der Definition der Differenzierbarkeit sind wir vom Differenzenquotienten ausgegangen und haben dessen Limes gebildet. Dieses Herangehen funktioniert in \mathbb{R} recht gut, es läßt sich so aber nicht auf Funktionen mehrerer Veränderlicher übertragen, da z.B. in \mathbb{R}^n eine solche Division nicht erklärt ist. Daher werden wir jetzt eine gleichwertige Definition der Differenzierbarkeit aufstellen, die sich auch auf Funktionen mehrerer Veränderlicher übertragen läßt. Hierbei wird gleichzeitig das „Wesen der Differenzierbarkeit“ herausgearbeitet.

7/1/9

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ und $a \in \mathbb{R}$.

Ist f in a differenzierbar, dann existiert bekanntlich der Grenzwert:

$$b := f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a},$$

folglich gibt es eine Funktion $r(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, so daß $r(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$ und

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = b + r(x) \implies$$

$$f(x) = f(a) + b \cdot (x - a) + r(x) \cdot (x - a).$$

Damit haben wir folgende Information:

Ist f in a differenzierbar, dann gibt es eine reelle Zahl b und eine Funktion r mit $r(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$, so daß sich die Funktion f in einer Umgebung von a darstellen läßt in der Form:

$$f(x) = f(a) + b(x - a) + r(x)(x - a).$$

Offenbar ist $o(x) := r(x)(x - a)$ ebenfalls eine Funktion, so daß

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{o(x)}{|x - a|} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{r(x)(x - a)}{|x - a|} = \lim_{x \rightarrow a} r(x) = 0.$$

(In diesem Zusammenhang sagen wir auch, daß $o(x)$ mit $x \rightarrow a$ von höherer als erster Ordnung gegen null strebt.)

Umgekehrt gelte nun folgendes:

Die Funktion f sei in einer Umgebung $U(a)$ definiert, und es gebe eine Konstante b und eine Funktion $o(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, so daß für alle $x \in U(a)$ gilt:

$$f(x) = f(a) + b(x - a) + o(x), \text{ wobei } \lim_{x \rightarrow a} \frac{o(x)}{|x - a|} = 0.$$

Für $x \neq a$ gilt dann

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = b + r^*(x), \text{ wobei } r^*(x) := \frac{o(x)}{x - a}.$$

Offenbar ist

$$\lim_{x \rightarrow a} r^*(x) = 0.$$

Folglich existiert

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = b,$$

d.h., f ist an der Stelle a differenzierbar und $f'(a) = b$. Hieraus ergibt sich sofort, daß das nach Voraussetzung existierende b schon eindeutig bestimmt ist.