

Kapitel 6

Der n -dimensionale euklidische Raum \mathbb{R}^n ; Funktionen mit mehreren Veränderlichen

6.1 Der Raum \mathbb{R}^n

Definition. (*metrischer Raum*)

6/1/10

Es sei \mathbb{M} eine nicht-leere Menge und $\varrho : \mathbb{M} \times \mathbb{M} \rightarrow \mathbb{R}$ (d.h., für $a, b \in \mathbb{M}$ ist $\varrho(a, b) \in \mathbb{R}$), so daß für alle $a, b, c \in \mathbb{M}$ gilt:

- (1) $\varrho(a, b) \geq 0$, und $\varrho(a, b) = 0 \iff a = b$.
- (2) $\varrho(a, b) = \varrho(b, a)$. (Symmetrie)
- (3) $\varrho(a, b) \leq \varrho(a, c) + \varrho(c, b)$. (Dreiecksungleichung)

Dann ist ϱ eine *Metrik* oder *Abstandsfunktion* in \mathbb{M} , und das Paar (\mathbb{M}, ϱ) heißt *metrischer Raum*.

Definition. (*ε -Umgebung*)

6/1/12

Es sei $a \in \mathbb{M}$, $\varepsilon \in \mathbb{R}$ und $\varepsilon > 0$.

$U_\varepsilon(a)$ heißt *ε -Umgebung* von a (in \mathbb{M})

$\stackrel{\text{Df}}{=} U_\varepsilon(a) := \{x \in \mathbb{M} : \varrho(x, a) < \varepsilon\}$.

Definition. (*Umgebung*)

6/1/16

Es sei $a \in \mathbb{M}$ und $U \subseteq \mathbb{M}$.

- (1) U ist eine *offene Umgebung* von a

$\stackrel{\text{Df}}{=} U$ ist offen und $a \in U$.

- (2) U ist eine *Umgebung* von a

$\stackrel{\text{Df}}{=} \text{Es gibt eine offene Menge } U' \subseteq \mathbb{M} \text{ mit } a \in U' \text{ und } U' \subseteq U.$

Bez.: $U := U(a)$

Schwerpunkte für die Wiederholung von Kapitel 6

- Definitionen: metrischer Raum, ε -Umgebung, Umgebung;

6/7/3